

1929
AUS DER UNIVERSITÄTS-FRAUENKLINIK IN GÖTTINGEN
(DIREKTOR: PROFESSOR DR. H. MARTIUS)

Lane Medical Library

Blutgruppenbestimmungen bei 150 Müttern und ihren Neugeborenen

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
der Hohen Medizinischen Fakultät der
Universität zu Göttingen

vorgelegt von

Günther Deilmann

1929

VERLAG VON FERDINAND ENKE IN STUTTGART

Gedruckt mit Genehmigung der
Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen

Berichterstatter
Professor Dr. H. Martius

Zugleich veröffentlicht in Bd. 96 der Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie

Über die Herkunft der Agglutinine im Nabelschnurblut sind in der Literatur noch immer die Meinungen geteilt. Ein Teil der Autoren hält sie für ein „mütterliches Geschenk“, d. h. durch die Plazenta hindurchgewanderte Serum-eigenschaften der Mutter. Andere Autoren kommen auf Grund ihrer Untersuchungen zu der Ansicht, daß, zumindest in einem Teil der Fälle, die Agglutinine vom Kinde selbst gebildet sein müssen. Die vorliegende Arbeit soll zur weiteren Klärung dieses Problems beitragen. Zugleich ist in ihr das untersuchte Material biologisch verwertet worden. Es ist selbstverständlich, daß die Endergebnisse der Untersuchung von 150 Müttern und deren Neugeborenen wegen der geringen Zahl nicht als biologische Endergebnisse angesehen werden dürfen, jedoch würde sich bei Zusammenfassung ähnlicher Arbeiten die Möglichkeit bieten, ein genügend großes und damit biologisch zuverlässiges Material zu gewinnen.

Das Hauptaugenmerk bei den Untersuchungen richtete sich auf das Auftreten und die Stärke der Agglutinine erstens im Nabelschnurblut, dann im kindlichen Blut, das im allgemeinen nach 6 Tagen auf die Schwankungen im Agglutiningehalt hin geprüft wurde. In einer Reihe von Fällen wurde die Agglutininstärke durch den Titer bestimmt.

Die Heranziehung der Väter zur Blutgruppenbestimmung bereitete Schwierigkeiten, da der größte Teil der Gebärenden aus der näheren und weiteren Umgebung stammte und bei den „Hauschwangeren“ es unmöglich war, den Vater heranzuziehen. In den Fällen, in denen eine Untersuchung auch der väterlichen Blutgruppe vorgenommen wurde, stand sie im Einklang mit dem Befund bei Mutter und Kind. Wegen der Unvollständigkeit sind diese Ergebnisse aber nicht angeführt.

Über die theoretischen Grundlagen der Blutgruppeneinteilung sind bereits so viele Veröffentlichungen erfolgt, daß ich mir längere Ausführungen darüber ersparen kann. Um Irrtümer und Verwechslungen bei der Benennung der Blutgruppen zu vermeiden, habe ich zu ihrer Bezeichnung die Buchstabensymbole verwendet. Bevor ich nun über die Ergebnisse der Untersuchungen berichte, möchte ich kurz der technischen Seite Erwähnung tun.

T e c h n i k.

Für die vorliegenden Blutgruppenbestimmungen wurde zur Untersuchung des mütterlichen und des Nabelschnurblutes die S c h i f f s c h e Reagenzglasprobe, zur Nachkontrolle der Blutgruppe des Neugeborenen die Reagenzglasprobe und das Deckglasverfahren nach L a t t e s - d e D o m i n i c i s an-

Lfde. Nr.		Serum + Test- blutkörperchen		Blutkörperchen + Testserum		Blut- gruppe	Kontrolle			Ge- schlecht	Des Kindes		Gewicht der Plazenta
		A	B	A	B		Serum + Test	Blut- körperchen	Test		Gewicht	Länge	
1	Mutter . . .	—	++	—	++	Aβ	—	—	—	♂	4380	52	700
2	Kind . . .	—	++	—	++	O	—	—	—	♂	3500	49	570
3	Mutter . . .	—	++	—	++	Aβ	—	—	++	♂	3125	49	570
4	Mutter . . .	++	++	—	—	O α β	—	—	—	♀	2650	46	420
5	Mutter . . .	—	++	—	++	Aβ	—	—	++	♀	2680	48	
	Kind 1 . . .	—	—	—	—	Aβ	—	—	—	♀	2170	46	
	Kind 2 . . .	—	—	—	—	O	—	—	++	♀	2610	49	
	Kind 3 . . .	—	—	—	—	A	—	—	++	♀	400 → 1220		
6	Mutter . . .	++	++	—	—	O α β	—	—	—	♂	2550	46	400
7	Mutter . . .	—	++	—	++	Aβ	—	—	++	♀	3240	52	600
8	Kind . . .	—	—	++	++	AB	—	++	++	♂	3430	51	520
9	Mutter . . .	++	++	—	—	O α β	—	—	++	♂	3120	51	500
10	Kind . . .	—	—	—	—	Aβ	—	—	++	♂	4030	55	750
	Mutter . . .	++	++	—	—	O α β	—	++	—	♂	3470	50	570
11	Kind . . .	—	—	++	++	B α	—	—	—	♂	3185	50	500
12	Mutter . . .	—	++	++	++	B	—	—	—	♀	3260	51	600
13	Mutter . . .	—	—	—	—	Aβ	—	—	—	♂	3390	53	500
14	Kind . . .	++	++	—	—	O α β	—	—	—	♂			
	Mutter . . .	++	++	—	—	O	—	—	—	♂			
	Kind . . .	++	++	—	—	O α β	—	—	—	♂			

Blutgruppenbestimmungen bei 199	Blutgruppe	Alter	Sex	Größe	Gewicht	Temperatur	Puls	Druck	Blutdruck	Blutgruppe	Alter	Sex	Größe	Gewicht	Temperatur	Puls	Druck	Blutdruck
15	Mutter	49	♀	2940	400	—	—	—	—	—	49	♀	2940	400	—	—	—	—
16	Kind	53	♀	3800	640	—	—	—	—	—	53	♀	3800	640	—	—	—	—
17	Mutter	50	♀	3380	600	—	—	—	—	—	50	♀	3380	600	—	—	—	—
18	Kind	48	♀	3080	650	—	—	—	—	—	48	♀	3080	650	—	—	—	—
19	Mutter	50	♀	3050	480	—	—	—	—	—	50	♀	3050	480	—	—	—	—
20	Kind	49	♀	2750	500	—	—	—	—	—	49	♀	2750	500	—	—	—	—
21	Mutter	52	♀	3630	680	—	—	—	—	—	52	♀	3630	680	—	—	—	—
22	Kind	50	♂	2670	450	—	—	—	—	—	50	♂	2670	450	—	—	—	—
23	Mutter	50	♀	3120	500	—	—	—	—	—	50	♀	3120	500	—	—	—	—
24	Kind	54	♀	3530	640	—	—	—	—	—	54	♀	3530	640	—	—	—	—
25	Mutter	48	♀	2495	550	—	—	—	—	—	48	♀	2495	550	—	—	—	—
26	Kind	49	♀	2710	500	—	—	—	—	—	49	♀	2710	500	—	—	—	—
27	Mutter	51	♀	3405	550	—	—	—	—	—	51	♀	3405	550	—	—	—	—
28	Kind	52	♀	3290	700	—	—	—	—	—	52	♀	3290	700	—	—	—	—
29	Mutter	53	♂	3650	450	—	—	—	—	—	53	♂	3650	450	—	—	—	—
30	Kind	55	♂	3750	780	—	—	—	—	—	55	♂	3750	780	—	—	—	—
31	Mutter	53	♂	3980	750	—	—	—	—	—	53	♂	3980	750	—	—	—	—
32	Kind	52	♀	3150	500	—	—	—	—	—	52	♀	3150	500	—	—	—	—
33	Mutter	50	♀	3325	450	—	—	—	—	—	50	♀	3325	450	—	—	—	—

Fide. Nr.		Serum + Test- blutkörperchen		Blutkörperchen + Testserum		Blut- gruppe	Kontrolle				Ge- schlecht	Des Kindes		Gewicht der Plazenta
		A	B	A	B		Serum + Test	A	B	Blut- körperchen + Test		Gewicht	Länge	
34	Mutter Kind . . .	—	+++	—	+++	A β	—	—	—	+++	♂	3310	52	620
35	Mutter Kind . . .	+++	+++	—	—	A α β	—	—	—	—	♀	3520	51	600
36	Mutter Kind . . .	—	—	+++	+++	O	—	—	—	—	♂	3120	52	600
37	Mutter Kind . . .	—	+++	—	+++	A β	—	—	—	+++	♀	1940	45	320
38	Mutter Kind . . .	—	—	+++	+++	A α β	—	—	—	+++	♂	3620	51	770
39	Mutter Kind . . .	+++	+++	—	—	O	—	—	—	—	♀	3540	53	520
40	Mutter Kind . . .	+++	—	—	+++	A α β	—	—	—	+++	♀	3620	51	700
41	Mutter Kind . . .	—	—	+++	—	B α	—	—	—	+++	♀	3210	49	590
42	Mutter Kind . . .	—	+++	—	+++	A β	—	—	—	+++	♂	2970	50	500
43	Mutter Kind . . .	—	—	+++	+++	A α	—	—	—	+++	♂	3790	55	720
44	Mutter Kind . . .	—	+++	—	+++	A β	—	—	—	+++	♀	2880	48	530
45	Mutter Kind . . .	+++	+++	—	—	O α β	+++	+	+	—	♀	1800	44	390
46	Mutter Kind . . .	—	—	+++	—	O	—	—	—	—	♀	3320	51	680
47	Mutter Kind . . .	—	—	+++	+++	A β	—	—	—	+++	♀	4220	53	630
48	Mutter Kind . . .	+++	+++	—	—	A	—	—	—	+++	♀	3990	53	800

[illegible]

Lfde. Nr.		Serum + Test- blutkörperchen	Blutkörperchen + Testserum		Blut- gruppe	Kontrolle		Ge- schlecht	Des Kindes		Gewicht der Plazenta
		A	B	A	B	Serum + Test	Blut- körperchen + Test		Gewicht	Länge	
68	Mutter	—	++	—	++	Aβ	—	♀	3020	50	520
69	Kind .	—	—	—	++	O	—	♂	3400	58	580
70	Mutter	—	+	—	++	Aβ	—	♀	3250	49	680
71	Kind .	—	—	—	++	A	—	♀	3565	52	700
72	Mutter	—	++	—	++	Aβ	—	♀	3070	49	600
73	Kind .	—	+	—	+	O αβ	—	♂	3440	51	700
74	Mutter	++	—	++	—	B α	++	♀	3140	49	800
75	Kind .	—	—	—	++	B	—	♀	2420	48	560
76	Mutter	—	++	—	++	Aβ	—	♀	3870	52	570
77	Kind .	—	+	—	++	A	—	♂	3350	50	550
78	Mutter	++	++	—	—	O αβ	—	♀	3410	51	570
79	Kind .	—	+	—	++	O	—	♀	3240	54	450
80	Mutter	+	—	++	—	Aβ	—	♀	3950	53	600
81	Kind .	—	—	—	++	O	—	♂	3500	52	500
82	Mutter	—	++	—	++	Aβ	—	♀	3590	52	600
	Kind .	—	—	—	—	O	—	♂			

[illegible]

Lfde. Nr.		Serum + Test- blutkörperchen		Blutkörperchen + Testserum		Blut- gruppe	Kontrolle			Ge- schlecht	Des Kindes		Gewicht der Plazenta
		A	B	A	B		Serum + Test	Blut- körperchen + Test	B		Gewicht	Länge	
102	Mutter Kind . . .	++ ++	++ —	++ ++	— —	O α β B	++ —	++ —	—	♀	2985	48	480
103	Mutter Kind . . .	++ —	++ —	++ ++	++ ++	A β A	— —	— —	++ ++	♀	3580	50	620
104	Mutter Kind . . .	++ ++	++ ++	++ ++	— —	O α β O	— —	— —	—	♂	2800	48	480
105	Mutter Kind . . .	++ —	++ —	++ ++	++ —	A β O	— —	— —	—	♂	4400	54	750
106	Mutter Kind . . .	— —	++ ++	++ ++	++ ++	A β A	— —	— —	++ ++	♀	4500	54	730
107	Mutter Kind . . .	— —	++ —	++ ++	++ ++	A β A	— —	— —	++ ++	♀	3000	47	620
108	Mutter Kind . . .	++ ++	— —	++ —	++ —	B α O	++ —	— —	—	♀	2760	48,5	380
109	Mutter Kind . . .	++ —	++ —	++ —	++ —	A β B	++ —	++ —	—	♀	2890	50	580
110	Mutter Kind . . .	++ ++	++ ++	++ ++	— —	O α β O	— —	— —	—	♂	2000	47	400
111	Mutter Kind . . .	++ ++	++ —	++ —	++ —	B α B	++ ++	++ ++	—	♂	2430	47	460
112	Mutter Kind . . .	++ ++	++ —	++ —	++ —	O α β B	++ ++	— —	—	♂	2000	47	410
113	Mutter Kind . . .	++ ++	++ ++	++ ++	— —	O α β O	— —	— —	—	♂	3700	53	600
114	Mutter Kind . . .	++ —	— —	++ —	++ —	B α AB	++ ++	++ ++	++ ++	♂	3505	52	700
115	Mutter Kind . . .	++ —	++ ++	++ ++	++ ++	O α β A	— —	— —	++ ++	♂	3450	50	650
116	Mutter Kind . . .	++ —	++ ++	++ ++	++ ++	O α β A	— —	— —	++ ++	♀	2950	49	500

[illegible]

Lfd. Nr.		Serum + Test- blutkörperchen		Blutkörperchen - Testserum		Blut- gruppe	Serum + Test		Kontrolle Blut- körperchen + Test		Ge- schlecht	Des Kindes		Gewicht der Plazenta
		A	B	A	B		A	B	A	B		Gewicht	Länge	
136	Mutter . . .	—	++	—	++	Aβ	—	—	—	—	♀	2670	50	480
137	Kind . . .	—	—	—	—	O αβ	—	—	—	—	♂	4280	56	680
138	Mutter . . .	++	++	—	—	O	—	—	—	—	♂	2570	48	370
139	Kind . . .	—	—	++	++	Aβ	—	—	—	++	♂	3080	50	560
140	Mutter . . .	++	++	—	—	O αβ	—	—	—	—	♀	3680	52	620
141	Kind . . .	++	++	—	—	O	—	—	—	++	♂	3590	52	550
142	Mutter . . .	++	++	—	—	A	—	—	—	—	♂	3570	53	400
143	Kind . . .	—	—	++	++	O	—	—	—	—	♂	2550	48,5	450
144	Mutter . . .	++	++	—	—	O αβ	—	—	—	—	♀	3130	50	500
145	Kind . . .	—	—	++	++	Aβ	—	—	—	++	♂	4860	56	1050
146	Mutter . . .	—	—	++	++	A	—	—	—	++	♂	4040	52	780
147	Kind . . .	++	++	—	—	O αβ	—	—	—	—	♂	3040	52	820
148	Mutter . . .	—	—	++	++	Aβ	—	—	—	—	♂	3710	52	400
149	Kind . . .	—	—	++	++	AB	—	—	++	++	♀	3500	50	500
150	Mutter . . .	++	++	—	—	O αβ	—	—	—	++	♂	3880	53	720
	Kind . . .	—	—	++	++	A	—	—	—	++	♂			

gründt. Frisches und einwandfreies Testblut stand jederzeit von den in der Klinik arbeitenden Schwangeren zur Verfügung. Es wurde bei jedem Blut der Titer festgestellt, damit die Bestimmungen mit dem jeweils niedrigsten Serum und den empfindlichsten Blutkörperchen vorgenommen werden konnten. Zur Blutgruppenbestimmung wurden bei der Mutter aus der Kubitalvene, bei dem Neugeborenen unmittelbar nach der Abnabelung aus der gesäuberten Nabelschnur einige Kubikzentimeter Blut in sterilen Reagenzgläsern aufgefangen. Zur Kontrolle der kindlichen Blutgruppe entnahm man am 6. Tage einige Blutropfen durch Einstich in die Fußsohle und bestimmte dann die Agglutinogene in einer Blutkörperchenaufschwemmung in der Reagenzglasprobe, die Agglutinine nach der Deckglasmethode nach Lattes-de Dominicis. Vor jeder Blutgruppenbestimmung fanden natürlich die entsprechenden Kontrollversuche mit dem Testblut statt.

In den vorstehenden Tabellen sind die einzelnen Untersuchungsergebnisse bemerkt. In der oberen Abteilung (Mutter) jeder fortlaufenden Nummer stehen sich die Ergebnisse der Blutuntersuchung bei der Mutter, in der unteren Abteilung (Kind) die des Kindes. Aus der Zusammenfassung der Spalte 3 unbekanntes Serum + bekannte Blutkörperchen — und Spalte 4 — unbekannte Blutkörperchen + bekanntes Serum — ergibt sich die Blutgruppe. Die Kontrolle wurde nur bei den Kindern ausgeführt, da ihre Agglutinine bei Schwankungen hin geprüft werden sollten, außerdem, da doch in manchen Fällen nach dieser Zeit eine stärkere Ausbildung der agglutinablen Substanz zu verzeichnen war. Es bedeutet: + schwache, ++ mäßige, +++ starke Agglutination.

Betrachten wir die Tabelle, so fällt auf, daß die Agglutinine durchaus unregelmäßig im Nabelschnurblut auftreten und meist nach den ersten 6 Tagen bereits aus dem kindlichen Blut verschwunden sind. In den meisten Fällen war bereits am 2. oder 3. Tage nach der Geburt eine starke Abschwächung der Serumeigenschaften vorhanden. Aber schon im Nabelschnurblut waren die meist erheblich schwächer als die mütterlichen Agglutinine. In einer Reihe von Fällen, in denen sowohl das mütterliche wie das Nabelschnurserum starke Agglutination zeigte, wurde bei beiden der Titer festgestellt. Während man bei der Mutter noch bei Verdünnungen von 1 : 30 bis 1 : 50 mäßige bis schwache Agglutination finden konnte, war im Nabelschnurblute bereits bei einer Verdünnung von 1 : 10 bis 1 : 20 die Reaktion sehr schwach, manchmal überhaupt als negativ anzusehen. In einigen Fällen ist noch am 6. Tage das Agglutinin nachweisbar (Fall 15, 29, 44, 51, 64, 102), doch ist seine Reaktionsfähigkeit merklich herabgesetzt. Es würde dieses für die von Jirschfeld und Zborowsky u. a. geäußerte Annahme sprechen, daß die im Nabelschnurblut enthaltenen Agglutinine ein „mütterliches Gegeben“ seien. Gegen diese Annahme spricht der Befund in den Fällen 23 und 31. Im Fall 23 fand sich bei der Mutter fehlende Agglutination mit Test-

blutkörperchen A, mäßige mit Testblutkörperchen B. Das Kind agglutinierte die A- und B-Testblutkörperchen stark. Bei der Untersuchung der Blutkörperchen fand sich, entsprechend dem Befund im Serum, für die Mutter Gruppe A β , für das Kind Gruppe O $\alpha \beta$. Eine sofortige Kontrolle mit anderen Testblutsorten ergab das gleiche Resultat. Kontrolle am 2. Tage nach der Geburt: Blutkörperchen Gruppe O. Serum + Testkörperchen A +. Serum + Testkörperchen B + + +. Kontrolle am 4. Tage: Serum + Testkörperchen A —. Serum + Testkörperchen B +. Kontrolle am 6. Tage: Blutkörperchen Gruppe O, Agglutinine vollkommen aus dem Serum verschwunden. Kontrolle der mütterlichen Blutgruppe ergibt A β . Ähnlich liegt der Fall 31. Mütterliche Blutgruppe B α , kindliche Blutgruppe O. Im Serum des Nabelschnurblutes α und β in mäßiger Stärke. Am 2. und 6. Tage kindliche Blutgruppe O, Agglutinine nicht mehr nachweisbar.

Aus diesen Befunden würde hervorgehen, daß die im Nabelschnurblut gefundenen Agglutinine nicht unbedingt, wie es Hirschfeld und Zborowsky annehmen — „Das Nabelschnurblut enthält keine vom Kinde produzierten Antikörper“ —, durch die Plazenta hindurchgewanderte mütterliche Serumeigenschaften sein müssen. Sie würden eher die Auffassung zulassen, daß vom Kinde eigenes Agglutinin gebildet werden kann. Daß nebenher noch mütterliche Serumeigenschaften durch die Plazenta in das kindliche Blut gelangen und dort nachweisbar sind, ist durchaus möglich. Sonderbar ist, daß das im Fall 23 kindeigene Agglutinin α bereits am 2. Tage post partum stärker abgeschwächt erschien und schneller aus dem Blute verschwand als β . Ich möchte aus diesen Befunden noch keine bindenden Schlüsse ziehen in bezug auf die Frage „von der Mutter übergewandertes“ oder „kindeigenes“ Agglutinin, sondern erst an Hand weiterer Untersuchungen darüber eine Entscheidung treffen, da ja gerade beim Nabelschnurblut unspezifische Reaktionen eine Rolle spielen und die Fehlerquelle dadurch vergrößern.

Unter den beobachteten 150 Fällen fanden sich 3 mit drohender, 6 mit ausgebrochener Eklampsie. Als drohende Eklampsie galten Fälle mit starken Ödemen, starker Eiweißausscheidung im Urin und den gewöhnlichen Intoxikationserscheinungen: Kopfschmerz, Augenflimmern usw. Nach den Untersuchungen von Dienst im Jahre 1905 hat ein beträchtlicher Prozentsatz von Gebärenden bereits vor der Plazentalösung eine nicht mehr intakte Plazenta. Dienst fand dieses, indem er gleich nach der Geburt eine Farblösung in die Nabelvene einspritzte, die nach kurzer Zeit von der Mutter durch den Harn ausgeschieden wurde. Bei den von ihm untersuchten Fällen von Eklampsie traf nun eine heterospezifische Schwangerschaft mit dieser Beschädigung der Plazenta zusammen. Bei weiteren Untersuchungen ließ sich diese Theorie nicht mehr halten, und Dienst hat sie später selbst aufgegeben. 1923 wurde von Mac Quarrie, die die Arbeiten von Dienst

echt kannte, in einer ähnlichen Arbeit die Entstehungsursache der Eklampsie auf die Ungleichheit der Blutgruppen von Mutter und Kind bezogen. Auch hier hielt das erste Ergebnis den Nachprüfungen nicht stand. In den nachfolgenden Tabellen werden die Befunde bei Eklampsie angegeben. Gleichzeitig setze ich noch das Auftreten bzw. Fehlen der Agglutinine im Nabelschnurblut hinzu.

Drohende Eklampsie.

Mutter	Kind	Geschlecht	Agglutinine im Nabelschnurblut
O	O	♀	α ++ β ++
A	O	♀	—
O	O	♂	α ++++ β ++++

Eklampsie.

Mutter	Kind	Geschlecht	Agglutinine im Nabelschnurblut
A	A	♀	—
O	O	♀	—
O	B	♀	—
O	B	♀	α +++
A	B	♀	—
A	O	♀	β ++

Betrachten wir diese 9 Fälle gemeinsam, so finden sich darunter 4 homo- und 5 heterospezifische Schwangerschaften. In 4 Fällen waren Serumeigenschaften im Nabelschnurblut nachweisbar. Das Geschlecht hat keinen Einfluß auf die Entstehung der Eklampsie: es waren 4 Kinder männlichen, 5 Kinder weiblichen Geschlechts. Die Beobachtung Heims, daß sämtliche Früchte männlichen Geschlechts waren, dürfte wohl auf Zufälligkeit beruhen. Im Fall 2 der Tabelle I, in der Haupttabelle Fall 60, handelt es sich um Hydrops universalis.

Ausgehend von den von Dienst und Mac Quarrie festgestellten Beschädigungen der Plazenta wurde versucht, nachzuweisen, ob in Fällen heterospezifischer Schwangerschaft eine Bindung mütterlicher Serumeigenschaften an die kindlichen Blutkörperchen vorkäme. Gehörte das Kind der Blutgruppe O an, so war hier der Nachweis unmöglich, da ja eine Bindung der Agglutinine an die O-Blutkörperchen nicht stattfindet. In Frage kommen daher nur die Fälle 6, 7, 8, 10, 22, 28, 29, 39, 45, 47, 49, 58, 61, 63, 72, 79, 83, 90, 102, 109, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 132, 140, 148, 149, also 30 Fälle. Die Untersuchungen gestalteten sich folgendermaßen:

Zur Prüfung wurden sterile Röhrchen und Pipetten verwendet. In Röhrchen 1 wurden Testblutkörperchen der der kindlichen Blutgruppe entsprechenden Gruppe, nehmen wir an, es sei Gruppe A, mit Testserum der Gruppe B

gemischt, auf Eis gekühlt und etwa $\frac{1}{2}$ —1 Minute bei 2000 Umdrehungen zentrifugiert. Der Überschuß an Flüssigkeit wurde abgehoben. In Röhrchen 2 wurden Testblutkörperchen A, in Röhrchen 3 die auf gebundenes Agglutinin zu untersuchenden kindlichen Blutkörperchen, in unserem angenommenen Falle A-Blutkörperchen gefüllt. Darauf wurde in alle 3 Röhrchen sterile physiologische Kochsalzlösung gefüllt, gut geschüttelt und zentrifugiert. Die überstehende Flüssigkeit wurde abpipettiert. Diese Auswaschung wurde 3- bis 4mal wiederholt. Beim letzten Male wurden möglichst geringe Mengen von Kochsalzlösung verwendet. Nach dem Zentrifugieren wurde an den empfindlichsten Blutkörperchen, die zurzeit zur Verfügung standen, nachgeprüft, ob auch jeglicher Rest von Agglutininen ausgewaschen war. Im anderen Falle mußte die Waschung wiederholt werden. War in der Kochsalzlösung Agglutinin nicht mehr nachweisbar, so wurden alle 3 Röhrchen, in denen sich die Blutkörperchen als Bodensatz befanden, mit einer möglichst geringen Menge Kochsalzlösung beschickt, gut durchgeschüttelt und für etwa 5 Minuten in ein Wasserbad von 54 ° C gestellt. Danach wurde in den ebenfalls erwärmten Zentrifugentaschen schnell zentrifugiert. Die überstehende Flüssigkeit, in der eventuell abgesprengtes Agglutinin enthalten sein mußte, wurde gegenüber empfindlichen A- und B-Testblutkörperchen geprüft.

Die Ergebnisse in allen 30 Fällen waren: Agglutination durch die überstehende Flüssigkeit in Röhrchen 1 (Testblutkörperchen + Testserum) positiv, in Röhrchen 2 (Testblutkörperchen) negativ, in Röhrchen 3 (kindliche Blutkörperchen) negativ. Es geht aus diesen Untersuchungen hervor, daß, zumindest während der Geburt, durch eine nicht intakte Plazenta nennenswerte, nachweisbare und eventuell das Kind schädigende Mengen von mütterlichem Agglutinin nicht in das Nabelschnurblut übertreten.

Ein Einfluß der Gruppenverschiedenheit zwischen Mutter und Kind auf die Entstehung des Icterus neonatorum konnte nicht festgestellt werden. Was die Zahl der Kinder und den Grad der ikterischen Verfärbung betrifft, ergaben die Beobachtungen kein Überwiegen der Erkrankung bei gruppenfremden Kindern.

Interessant war die Untersuchung bei der Drillingsgeburt (Fall 5 der Haupttabelle). Die Kinder wurden in der Reihenfolge geboren, die in der Tabelle angegeben ist. Die Nabelschnüre wurden gekennzeichnet, ebenso besonders sorgfältig zur Vermeidung von Verwechslungen die sterilen Röhrchen, in denen das Nabelschnurblut aufgefangen wurde. Kind 1 und 3 besaßen eine zusammenhängende Plazenta. Bei der Betrachtung der Eihäute fanden sich 2 Amnien und 2 Chorien. Kind 2 hatte eine eigene Plazenta und eigene Eihäute. Es handelt sich also um dreieilige Drillinge. Kind 1 gehörte der Blutgruppe O, Kind 2 und 3 der Gruppe A an. Mutter und Vater besaßen ebenfalls beide die Blutgruppe A, und zwar, wie das Auftreten eines O-Kindes beweist, genotypisch die heterozygote Gruppe AR nach B e r n s t e i n.

Eine andere Beobachtung, die eventuell die Entstehung mancher „Ausnahmen“ von der B e r n s t e i n s c h e n Regel erklärt, möchte ich hier noch anführen. R e c h und W ö h l i s c h kommen auf Grund ihrer Untersuchungen unter anderem zu folgendem Ergebnis: „Bei der Geburt jedenfalls sind die Rezeptoren stets endgültig ausgebildet.“ Nach den Erfahrungen der vorliegenden Arbeit ist es jedoch möglich, daß die Blutkörpercheneigenschaften kurz nach der Geburt noch so schwach entwickelt sind, daß sie entweder überhaupt noch nicht oder nur mit sehr starken Seren nachgewiesen werden können. Bei meiner Beobachtung — es handelt sich um Fall 67 — gehörte die Mutter einwandfrei bei der ersten Gruppenbestimmung und bei mehreren Nachkontrollen der Gruppe A B o an. Im Nabelschnurblut waren Blutkörpercheneigenschaften nicht nachweisbar. Bestimmungen mit weiteren zwei eigenen Testseren und mit Hämotest ergaben ebenfalls keine Agglutination. Das Kind gehörte demnach anscheinend der Blutgruppe O an, war also eine „Ausnahme“ von der B e r n s t e i n s c h e n Regel. Bei der Kontrolle nach 6 Tagen wurden die kindlichen Blutkörperchen von dem schon bei der ersten Bestimmung verwendeten A-Serum in mäßiger Stärke agglutiniert, nach weiteren 5 Tagen fand sich sogar starke Agglutination mit verschiedenen A-Seren. Mit B-Seren fand eine Agglutination nicht statt. Das Kind gehörte also in Wirklichkeit der Gruppe B an. Sei es nun, daß die Blutkörpercheneigenschaften in diesem Fall bei der Geburt nur sehr wenig ausgebildet waren, sei es, daß die verschiedenen verwendeten Seren relativ zu schwach waren, diese Beobachtung zeigt, daß sogenannte „Ausnahmen“ von der B e r n s t e i n s c h e n Regel nach einiger Zeit nochmals unter allen Vorsichtsmaßnahmen nachgeprüft werden sollten, um Irrtümer in der Blutgruppenbestimmung zu vermeiden. Finden die Kontrolluntersuchungen erst nach einigen Monaten statt, so sollten in jedem Falle neben den Blutkörpercheneigenschaften auch die Serumeigenschaften nachgeprüft werden. Im Einklang mit dem eben erwähnten Befund stehen Beobachtungen von H a r a und W a k a o. Diese fanden bei ihrem Material, das zum Teil über längere Zeit beobachtet werden konnte, sogenannte „neutrale Blutzellen“, d. h. Blutkörperchen, die erst nach einigen Tagen nach der Geburt ihre Blutkörpercheneigenschaften erkennen ließen. In einem Falle beobachteten sie erst am 18. Tage nach der Geburt ein Auftreten des Agglutinogens B. Bei den vorliegenden Untersuchungen zeigte es sich auch mehrmals, daß kindliche Blutkörperchen, die im Nabelschnurblut mäßige oder schwache Agglutination ergaben, bei der Kontrolle nach 6 Tagen von oftmals demselben Testserum stärker agglutiniert wurden (Fall 5, 7, 37, 59, 72, 73, 75, 79, 93, 111, 134, 149).

Die Verteilung der Blutgruppen bei Müttern und Kindern läßt sich am besten in Tabellenform darlegen:

Mütter.

Gruppe	O	A	B	A B
Zahl	49	76	19	6
Prozent	32,7	50,6	12,7	4,0

Kinder.

Gruppe	O	A	B	A B
Zahl	56	66	25	5
Prozent	36,8	43,5	16,4	3,3

Von den 152 Kindern sind 74 = 48,7 % Knaben und 78 = 51,3 % Mädchen.

In der Arbeit von Hirschfeld und Zborowsky ist eine Tabelle angegeben über die prozentuale Durchlässigkeit der Plazenta bei den verschiedenen Blutgruppenkombinationen. Ich gebe sie hier wieder und füge eine Tabelle hinzu, die die Verhältnisse bei vorliegenden Untersuchungen wiedergibt und die gleichzeitig angibt, in welcher Stärke die Serumeigenschaften im Nabelschnurblut nachweisbar waren.

Nach Hirschfeld und Zborowsky.

Mutter	O			A		B	
Kind	O	A	B	O	A	O	B
Durchlässigkeit	92 %	12 %	54 %	15 %	4 %	18 %	22 %

Eigene Beobachtungen.

Kombination	In Prozenten			
	+	++	+++	Gesamt
O—O	—	30,0	30,0	86,7
O—A	—	20,0	30,0	50,0
O—B	—	11,1	33,3	44,4
A—O	10,0	30,0	5,0	45,0
A—A	1,9	21,6	19,6	43,1
B—O	16,7	33,7	—	50,0
B—B	11,1	11,1	22,2	44,4

In den Fällen, in denen sowohl Mutter wie Kind zur Blutgruppe O gehörten, waren manchmal die im Nabelschnurblut gefundenen Agglutinine von verschiedener Stärke bzw. fehlte ein Agglutinin vollkommen. Diese Fälle (26,7 %) sind zu den in der Tabelle angeführten hinzuzufügen, so daß dann die Gesamtsumme von 86,7 % erreicht wird.

Zur biologischen Verwertung des vorliegenden Materials wurden nur die Zahlen für reife Früchte verwertet. Neben der Schwangerschaftsdauer wurden in fraglichen Fällen die von Wehefritz gemachten Angaben verwertet. Nach Ausschaltung von Frühgeburten und Mißgeburten (Fall 69, Enzephalozystozele) blieben 134 Mütter mit 134 Kindern. Die Verteilung der Ge-

schlechter bei den einzelnen Blutgruppen sowie der Durchschnitt von Gewicht, Länge und Plazentargewicht sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Mutter	Kind	Durchschnitt			Geschlecht	
		Gewicht	Länge	Plazenta	♂	♀
O	O	3399,1	51,4	589,6	13	14
—	A	3516,7	51,0	564,4	6	3
—	B	3275,5	50,8	606,7	3	3
A	O	3530,9	51,6	627,6	11	6
—	A	3401,2	50,9	612,8	21	25
—	B	3123,3	50,3	593,3	—	3
—	A B	3416,7	52,7	500,0	1	2
B	O	3357,0	50,9	542,0	2	3
—	A	3596,7	53,7	466,7	2	1
—	B	3513,8	51,1	661,3	4	4
—	A B	3505,0	52,0	700,0	1	—
A B	A	3102,5	50,0	625,0	2	—
—	B	3106,7	49,7	610,0	—	3
—	A B	3450,0	49,0	500,0	1	—

Zum Vergleich soll eine Tabelle über das Durchschnittsgewicht bei den einzelnen Blutgruppen von 720 Kindern gebracht werden, die der Arbeit von Preger entnommen ist.

Durchschnittsgewicht von 720 Kindern nach Preger.

Mutter	O				A				B				A B			
	Kind				O				A				B			
Durchschnittsgewicht	3236	3250	3080	—	3163	3250	3334	3284	3225	3240	3168	3033	?	3135	3223	3234

Hier ist das Gewicht bei den verschiedenen Blutgruppen ziemlich ausgeglichen, während bei dem kleineren Material immerhin Schwankungen bis zu 400 g zu verzeichnen sind. Interessant ist, daß bei einer so ausgesprochenen Gruppenverschiedenheit wie Mutter B, Kind A, die Kinder das größte Durchschnittsgewicht, die größte Durchschnittslänge, gleichzeitig aber auch das geringste Durchschnittsgewicht der Plazenta besitzen. Aus dieser Tatsache Schlüsse zu ziehen, ist unmöglich, da es sich nur um 3 Fälle handelt. Immerhin steht diese Kombination auch bei einem so großen Material wie dem in der Preger'schen Arbeit erwähnten an Gewicht an vierter Stelle. Ein schädigender Einfluß der Gruppenungleichheit von Mutter und Kind ist jedenfalls nach den bisher erhobenen Befunden nicht wahrscheinlich.

Ordnet man die Gewichte der Neugeborenen in gleicher Weise an, wie sie Hirschfeld in seinem Buch über Blutgruppenforschung und Konstitutionsserologie S. 149 angibt, so entsteht umstehende Tabelle:

Die Beobachtung von Hirschfeld und Zborowsky, daß bei den Gruppen A und O die Heterospezifität einen ungünstigen Einfluß auszuüben scheint, bestätigt sich bei vorliegendem Material nicht. Das Durchschnittsgewicht beträgt für homospezifische Kinder 3338 g, für heterospezifische 3311 g.

Gruppen		Geburtsgewicht in Gramm von										Weniger als 3200	Mehr als 3200	Zahl
Mutter	Kind	2000 bis 2299	2300 bis 2599	2600 bis 2899	2900 bis 3199	3200 bis 3499	3500 bis 3799	3800 bis 4099	4100 bis 4399	4400 bis 4699	4700			
O	O	1	2	3	5	6	7	4	1	—	—	11	18	29
	A	—	1	—	2	2	3	1	1	—	—	3	7	10
	B	1	1	1	2	1	1	1	—	—	—	5	3	8
A	O	—	—	1	5	1	6	3	1	1	—	6	12	18
	A	1	3	4	12	10	11	7	—	1	1	20	30	50
	B	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	3	1	4
	AB	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	3
B	O	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	3	3	6
	A	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	3
	B	—	1	1	—	3	2	2	—	—	—	2	7	9
	AB	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
AB	A	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2
	B	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	2	3
	AB	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1

Wie steht es nun mit dem Einfluß der mütterlichen Blutgruppen auf das Geschlecht des Kindes? Hirschfeld und Zborowsky fanden bei ihren Untersuchungen, daß bei den AB-Müttern die Kinder männlichen Geschlechts um ein beträchtliches überwogen. Sie fanden dabei folgende Verteilung:

Geschlecht der Kinder bei Müttern der Gruppe AB.

Kindliche Gruppe	O	A	B	AB
Söhne	1	10	8	5
Töchter	0	2	3	3

Es waren unter 32 Kindern von AB-Müttern 24, also 75 %, Knaben. Die Ergebnisse bei den anderen Blutgruppen können fortgelassen werden, da sie hier nicht interessieren. Unter den vorliegenden Untersuchungen finden sich nur 6 AB-Mütter. Von ihren Kindern sind 3 männlichen, 3 weiblichen Geschlechtes. Schlüsse lassen sich auch hier wegen der geringen Zahl nicht ziehen. Da es sich bei der Gruppe AB um die am wenigsten vorkommende Blutgruppe handelt, so wird man hier erst relativ spät zu einem genügend großen Material kommen, um über diese Frage ein endgültiges Urteil abgeben zu können. Bei den anderen Blutgruppenkombinationen ist jedenfalls ein Einfluß auf das Geschlecht nicht anzunehmen, was auch von anderen Untersuchern (Ohnesorge u. a.) betont wird.

Zusammenfassung.

Bei der Untersuchung von 150 Müttern und ihren Neugeborenen fanden sich bei den Müttern keine Defekttypen, bei den Kindern keine Ausnahmen von der Bernsteinschen Regel.

In den Fällen, in denen neben Mutter und Kind auch der Vater untersucht werden konnte, fand sich niemals eine Abweichung von den Vererbungsgesetzen.

Eine Entscheidung darüber, ob die im Nabelschnurblut gefundenen Agglutinine von der Mutter stammen oder vom Kind selbst gebildet werden, konnte an Hand von zwei Beobachtungen nicht sicher entschieden werden.

Im Nabelschnurblut gefundene Agglutinine verschwinden in fast allen Fällen im Laufe weniger Tage aus dem kindlichen Blut.

Die Feststellungen, daß Gruppenverschiedenheit für die Entstehung der Ikterus neonatorum ohne Bedeutung ist, bestätigen sich.

An die kindlichen Blutkörperchen gebundenes mütterliches Agglutinin ist bei Heterospezifität im Nabelschnurblut nicht nachweisbar.

Schwache Rezeptoren können bei Untersuchung nur des Nabelschnurblutes Ausnahmen von der Bernsteinschen Regel vortäuschen.

Bei der Blutgruppenkombination Mutter B, Kind A fand sich neben höchstem Gewichts- und Längendurchschnitt der geringste Durchschnitt für das Plazentargewicht.

L i t e r a t u r.

- Bernstein, Zeitschr. f. indukt. Abstammungs- und Vererbungslehre. 1925, S. 237. — Derselbe, Klin. Wochenschr. 1924, Nr. 33, S. 1924. — Breitner, Naturwissenschaften 1928, Heft 45—47, S. 849. — Collon, Compt. rend. de la Soc. de Biol. 1926, Bd. 94, Nr. 6, S. 418. — de Biasi, Journ. of the Amer. med. Assoc. 1923, S. 1776. — Dienst, Zentralbl. f. Gynäkol. 1905, Nr. 12, S. 353. — Dölter, Med. Klinik 1925, Nr. 36. — Fellenberg und Döll, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. 1914, Bd. 75, S. 285. — Förster, Med. Klinik 1928, S. 926. — Happ und Zelter, Journ. of the Amer. med. Assoc. 1924, S. 227. — Hara und Wakao, Jahrb. f. Kinderheilk. 1926, S. 313. — Heim, Monatsschr. f. Geb. u. Gynäkol. 1926, S. 52. — Hirschfeld, Naturwissensch. Heft 2. — Derselbe, Blutgruppenforschung und Konstitutionsheredität. Verlag Springer. — Hirschfeld und Seidel, Zeitschr. f. Hygiene 1925, S. 103. — Hirschfeld und Zborowsky, Klin. Wochenschr. 1925, Nr. 24, S. 1152. — Koller, Archiv der Julius-Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene 1926, Heft 3 und 4. Orell Füßli, Zürich. — Laffont et Gaujoux, Compt. rend. de la Soc. de Biol. 1923, S. 730. — Lattes, Die Individualität des Blutes, übersetzt von Schiff. 1925, Springer. — Mayer, Monatsschr. f. Geb. u. Gynäkol. 1925, S. 131. — Mac Quarrie, Bull. of John Hopkins Hosp. 1923, S. 51. — Ohnesorge, Zentralbl. f. Gynäkol. 1925, S. 2887. — v. Oettingen und Witebsky, Münch. med. Wochenschr. 1928, S. 385. — Preger, Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. experim. Therapie 1927, S. 192. — Rech und Wöhlisch, Zeitschr. f. Biol. 1926, S. 515. — Schiff, Die Technik der Blutbestimmung. 1926, Springer. — Derselbe, Klin. Wochenschr. 1927, S. 303. — Derselbe, Deutsche med. Wochenschr. 1928, S. 5. — Schulz und Wöhlisch, Klin. Wochenschr. 1924, S. 1614. — Vezár, Klin. Wochenschr. 1927, S. 347. — Wehefritz, Arch. f. Gynäkol. Bd. 129, Heft 2, S. 227. — Wellisch, Klin. Wochenschr. 1928, S. 545. — v. Zubrezicky und Wolfsgruber, Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 5.

Lebenslauf.

Ich wurde am 3. Oktober 1904 in Dortmund i. Westf. als Sohn des Bergreferendars Julius Deilmann geboren. Ich besuchte das Realgymnasium zu Oberhausen, das Progymnasium zu Werden-Ruhr und das Realgymnasium zu Essen-Bredeney, wo ich Ostern 1922 die Reifeprüfung bestand. Anschließend studierte ich 5 Semester Medizin in Freiburg i. Br. Die letzten 5 Semester studierte ich in Berlin und bestand dort meine ärztliche Prüfung am 17. Oktober 1927. Ich war dann als Medizinalpraktikant 8 Monate an der Universitätsfrauenklinik Göttingen und 4 Monate an der II. medizinischen Klinik der Charité in Berlin, danach 4 Monate als Volontärarzt an den städtischen Krankenanstalten Essens auf der chirurgischen Abteilung. Seit dem 1. April 1929 bin ich als Assistenzarzt an der chirurgischen Abteilung am Huyssenstift in Essen tätig.